

	EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Menores de 5 años	Desde los 6 meses	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			A los 28 días de la primera	

	EDAD GESTACIONAL	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Gestantes	Semana 12	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			Segunda (21 días de la primera)	
			Dosis adicional a los 6 meses de finalizado el esquema	

	EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Mujeres	Mujeres de 9-17 años	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			Segunda (según el biológico administrado sera 21 o 28 días)	
			Desde los 12 años Refuerzo (administra a los 6 meses de la segunda dosis)	
	Mujeres en Edad Fértil (MEF) entre los 10 y 49 años	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			Segunda (según el biológico administrado sera 21 o 28 días)	
			Desde los 12 años Refuerzo (administra a los 6 meses de la segunda dosis)	

	EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Adultos	Mayores de 60 años	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			Segunda (según el biológico administrado sera 21 o 28 días)	
			Refuerzo (administra a los 6 meses de la segunda dosis)	
	Adultos	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			Segunda (según el biológico administrado sera 21 o 28 días)	
			Refuerzo (administra a los 6 meses de la segunda dosis)	

**Nota:dosis adicional COVID para población priorizada.**

<b>Población priorizada</b>	<b>Dosis Adicional</b>	<b>Biológico</b>
Gestantes	Se debe administrar cuando hayan pasado 6 meses de su esquema de vacunación	•Pfizer
Mayores de 60 años	Se debe administrar después que hayan pasado al menos 6 meses de su esquema de vacunación.	•Pfizer •Moderna
Población con comorbilidades	Se debe administrar cuando hayan pasado 6 meses luego de su última dosis.	•Pfizer •Moderna
Talento Humano de Salud	Se debe administrar cuando hayan pasado 6 meses luego de su última dosis.	•Pfizer •Moderna