

	EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	
Menores de 5 años	Recién nacido	BCG	Única	Meningitis tuberculosa	
		Hepatitis B	Recién nacido	Hepatitis B	
	A los 2 meses	Pentavalente	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)	Primera	Difteria - Tos ferina - Tétanos
			<i>Haemophilus Influenzae tipo b (Hib)</i>		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b
			Hepatitis B		Hepatitis B
		Polio	Poliomielitis		
		Rotavirus	Diarrea por Rotavirus		
	Neumococo	Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia			
	A los 4 meses	Pentavalente	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)	Segunda	Difteria - Tos ferina - Tétanos
			<i>Haemophilus Influenzae tipo b (Hib)</i>		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b
			Hepatitis B		Hepatitis B
		Polio	Poliomielitis		
		Rotavirus	Diarrea por Rotavirus		
	Neumococo	Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia			
	A los 6 meses	Pentavalente	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)	Tercera	Difteria - Tos ferina - Tétanos
			<i>Haemophilus Influenzae tipo b (Hib)</i>		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b
			Hepatitis B		Hepatitis B
		Polio	Poliomielitis		
		Influenza estacional	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza		
	Desde los 6 meses	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones	
A los 7 meses	Influenza estacional	Primera	A los 28 días de la primera	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza	
		Segunda			
A los 12 meses	Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)	Primera	Sarampión - Rubeola - Paperas		
	Varicela	Refuerzo	Varicela		
	Neumococo	Única	Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia		
	Hepatitis A	Única	Hepatitis A		
A los 18 meses	Pentavalente	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)	Refuerzo	Difteria - Tos ferina - Tétanos	
		<i>Haemophilus Influenzae</i>		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i>	
		Hepatitis B		Hepatitis B	
	Polio	Poliomielitis			
	Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)	Primer Refuerzo		Sarampión - Rubeola - Paperas	
Fiebre Amarilla (FA)	Segunda	Fiebre amarilla			
A los 5 años	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)	Refuerzo	Difteria - Tos ferina - Tétanos		
	Polio		Poliomielitis		
	Varicela		Varicela		
	EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	
Niños	9 años de edad	Virus del Papiloma Humano (VPH)	Única	Cáncer causado por el virus del papiloma humano	
	EDAD GESTACIONAL	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	
Gestantes	Semana 12	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones	
			Segunda (21 días de la primera)		
			Dosis adicional a los 6 meses de finalizado el esquema		
	Semana 14	Influenza estacional	Única	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza	
	Semana 16	Toxide tetánico y diftérico	Depende del antecedente vacunal de la usuaria	Difteria - Tétanos - Tétanos neonatal	
Semana 26	Tdap (Tétanos - Difteria - Tos ferina Acelular)	Única	Tétanos neonatal - Difteria - Tos ferina del recién nacido		

	EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Mujeres	Mujeres de 9-17 años	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			Segunda (según el biológico administrado sera 21 o 28 días)	
			Desde los 12 años Refuerzo (administra a los 6 meses de la segunda dosis)	
		Virus del Papiloma Humano (VPH)	Única	Cáncer de cuello uterino
	Mujeres en Edad Fértil (MEF) entre los 10 y 49 años	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			Segunda (según el biológico administrado sera 21 o 28 días)	
Desde los 12 años Refuerzo (administra a los 6 meses de la segunda dosis)				
	Toxoide tetánico y diftérico del adulto (Td)	5 dosis: Td1: dosis inicial Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td2 Td4: al año de Td3 Td5: al año de Td4 Refuerzo cada 10 años	Difteria - Tétanos - Tétanos neonatal	

	EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Adultos	Mayores de 60 años	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
			Segunda (según el biológico administrado sera 21 o 28 días)	
			Refuerzo (administra a los 6 meses de la segunda dosis)	
		Influenza estacional	Anual	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza
		Solo en Bogotá Neumococo	Única	Neumonía
	Adultos	COVID-19	Primera	COVID-19 y sus complicaciones
		Segunda (según el biológico administrado sera 21 o 28 días)		
			Refuerzo (administra a los 6 meses de la segunda dosis)	

Nota:dosis adicional COVID para población priorizada.

Población priorizada	Dosis Adicional	Biológico
Gestantes	Se debe administrar cuando hayan pasado 6 meses de su esquema de vacunación	•Pfizer
Mayores de 60 años	Se debe administrar después que hayan pasado al menos 6 meses de su esquema de vacunación.	•Pfizer •Moderna
Población con comorbilidades	Se debe administrar cuando hayan pasado 6 meses luego de su última dosis.	•Pfizer •Moderna
Talento Humano de Salud	Se debe administrar cuando hayan pasado 6 meses luego de su última dosis.	•Pfizer •Moderna